

Produkt	Opis	Przygotowanie	Opakowanie
Cielęta			
VIMIX	Dostarcza niezbędne witaminy i minerały. Zapobiega powstawaniu niedoborów witamin i minerałów po przebytej chorobie, w następstwie kuracji antybiotykowej oraz w trakcie pojenia mlekiem pełnym. Zapobiega anemii, poprawia kondycję cieląt oraz wspomaga wzrost i rozwój.	25 g na 10 l mleka lub preparatu mlekozastępczego	2 kg wiaderko
Dawkowanie	Stosować przez okres 4-7 dni. W przypadku podawania mleka pełnego stosować przez 2 tyg. po okresie podawania siary.		
STARTMIX	Wzmacnia układ odpornościowy cieląt. Zawiera naturalne przeciwciała siarowe. Dzięki obecności probiotyku hamuje rozwój chorobotwórczych bakterii. Odbudowuje ściany jelit. Dzięki zawartości witamin poprawia zdrowotność zwierząt.	40 g(=2 miarki) na dawkę mleka lub preparatu mlekozastępczego	2 kg wiaderko
Dawkowanie	Profilaktycznie rozpocząć podawanie po okresie karmienia siarą. W trakcie choroby podawać aż do ustąpienia objawów chorobowych. Można także rozpuścić w letniej wodzie 40-80 g z preparatem EMIX, podawać dwa razy w ciągu dnia, w poważnych przypadkach 3-4 razy dziennie.		
EMIX	Wzmacnia równowagę elektrolitową u cieląt. Dostarcza elektrolity i łatwostrawną energię, zwiększa wchłanianie wody w przypadkach zaburzeń pokarmowych u cieląt.	25 g(=1 miarka) na 1l ciepłej wody	2 kg wiaderko 10 kg worek
Dawkowanie	Przy pierwszych oznakach biegunki: zmniejszyć ilość podawanego mleka o połowę, podawać 2-3 l Emix raz dziennie między odpojeniami mlekiem przez kolejne 2-3 dni. W przypadku silnej biegunki: podawać Emix zamiast mleka do dwóch dni a następnie rozpocząć podawanie mleka od 1/3-1/2 dawki wyjściowej i podawać Emix między odpojeniami mlekiem przez 2-3 dni.		
EMIX ULTRA	Silne działanie przeciwbiegunkowe. Ten wariant EMIXU działa znacznie szybciej w ostrych przypadkach zaburzeń pokarmowych. Nie tylko jest źródłem energii, elektrolitów, witamin i minerałów ale także dostarcza naturalne włókna roślinne, które natychmiastowo przywracają prawidłowe działanie układu pokarmowego zwiększając odporność cieląt.	50 g na 1l ciepłej wody	2 kg wiaderko
Dawkowanie	Przy pierwszych oznakach biegunki: zmniejszyć ilość podawanego mleka o połowę, podawać 2-3 l Emix Ultra raz dziennie między odpojeniami mlekiem przez kolejne 2-3 dni. W przypadku silnej biegunki: podawać 2 l Emix Ultra zamiast mleka 2-3 razy dziennie przez okres 2 dni a następnie rozpocząć podawanie mleka od 1/3-1/2 dawki wyjściowej i podawać Emix Ultra między odpojeniami mlekiem przez 2-3 dni.		
Krowy			
E-BOOST	Szczególne źródło energii dla krow po wycieleniu. Napój energetyczny zapewniający krowie szybką regenerację po wycieleniu. Uzupełnia płyny ustrojowe i zwiększa pobranie suchej masy. Dostarcza łatwostrawny wapń zapobiegając podklinicznemu zaleganiu poporodowemu. Wypełniając przestrzeń jamy brzusznej po porodzie zapobiega przemieszczeniom trawieńca. Ze względu na swoje walory smakowe bardzo chętnie pobierany przez krowy.	50 g na 1 l ciepłej wody	10 kg worek
Dawkowanie	Podawać 20-30 l ciepłego pójła bezpośrednio po wycieleniu.		